

22 「一等米になれなかった」品位格付理由（平成16年3月末現在）

単位：t、%

| 順位 | 項目 理由別 | 15年産 | | | | | | | 項目 理由別 | 14年産 | | | | | | | 項目 理由別 | 13年産 | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | | 県計 | 村山 | 最上 | 置賜 | 内陸計 | 庄内 | 県計 | | 村山 | 最上 | 置賜 | 内陸計 | 庄内 | 県計 | 村山 | | 最上 | 置賜 | 内陸計 | 庄内 | | | |
| 1 | 着色粒 | 47.6 15,945 | 62.1 4,614 | 44.3 3,348 | 56.6 6,091 | 54.6 14,053 | 24.4 1,892 | 着色粒 | 52.8 22,344 | 50.0 3,785 | 49.7 4,186 | 72.2 10,088 | 60.2 18,059 | 34.6 4,282 | 着色粒 | 33.7 9,530 | 18.2 727 | 29.8 1,242 | 63.2 6,073 | 45.3 8,042 | 14.1 1,488 | | | |
| 2 | 形質 (充実度) | 25.8 8,654 | 18.5 1,374 | 33.2 2,509 | 24.6 2,654 | 25.4 6,536 | 27.3 2,117 | 未熟粒 (青未熟以外) | 14.7 6,225 | 5.0 378 | 6.2 523 | 8.2 1,143 | 6.8 2,044 | 33.8 4,181 | 未熟粒 (青未熟以外) | 24.6 6,971 | 15.8 630 | 6.9 288 | 10.3 992 | 10.7 1,910 | 48.1 5,062 | | | |
| 3 | 未熟粒 (青未熟以外) | 14.1 4,727 | 5.9 437 | 4.3 323 | 8.6 927 | 6.5 1,687 | 39.3 3,040 | 形質 (充実度) | 10.2 4,335 | 13.5 1,026 | 13.6 1,149 | 3.7 516 | 9.0 2,690 | 13.3 1,644 | 形質 (充実度) | 16.3 4,611 | 24.5 978 | 27.1 1,130 | 12.5 1,203 | 18.6 3,311 | 12.3 1,300 | | | |
| 4 | 未熟粒 (青未熟) | 3.5 1,165 | 2.9 213 | 7.2 543 | 2.3 248 | 3.9 1,004 | 2.1 161 | 形質 (心白・腹白) | 7.6 3,208 | 8.8 667 | 11.8 993 | 4.2 590 | 7.5 2,250 | 7.7 958 | 形質 (心白・腹白) | 10.1 2,868 | 10.4 417 | 6.8 282 | 4.1 393 | 6.1 1,091 | 16.9 1,777 | | | |
| 5 | 被害粒 (胴割粒) | 2.5 831 | 2.8 207 | 3.9 296 | 0.8 89 | 2.3 593 | 3.1 238 | 被害粒 (胴割粒) | 5.3 2,254 | 9.0 686 | 3.4 287 | 4.5 625 | 5.3 1,597 | 5.3 657 | 被害粒 (胴割粒) | 7.2 2,035 | 14.5 580 | 13.1 548 | 4.3 413 | 8.7 1,541 | 4.7 493 | | | |
| 6 | 形質 (肌ずれ) | 1.6 539 | 1.3 94 | 1.7 128 | 2.2 232 | 1.8 454 | 1.1 85 | 形質 (肌ずれ) | 2.5 1,064 | 3.7 278 | 3.5 297 | 2.5 355 | 3.1 931 | 1.1 133 | 形質 (肌ずれ) | 2.6 722 | 5.4 216 | 4.2 175 | 2.3 220 | 3.4 611 | 1.1 111 | | | |
| 7 | もみ混入 | 1.3 444 | 3.1 233 | 1.5 113 | 0.7 74 | 1.6 420 | 0.3 24 | 未熟粒 (青未熟) | 1.5 641 | 0.8 62 | 3.9 327 | 0.5 71 | 1.5 460 | 1.5 181 | 未熟粒 (青未熟) | 2.0 561 | 4.3 171 | 5.4 223 | 0.8 74 | 2.6 467 | 0.9 94 | | | |
| 8 | 形質 (心白・腹白) | 0.8 269 | 1.0 77 | 0.7 52 | 0.8 87 | 0.8 217 | 0.7 52 | もみ混入 | 1.1 460 | 2.9 218 | 1.7 140 | 0.5 72 | 1.4 431 | 0.2 29 | もみ混入 | 1.5 412 | 3.7 146 | 2.8 116 | 1.0 99 | 2.0 361 | 0.5 51 | | | |
| 9 | 死米 | 0.1 40 | 0.1 6 | 0.2 13 | 0.2 20 | 0.2 39 | 0.0 1 | 被害粒 (茶米) | 0.0 11 | 0.0 3 | - - | - - | 0.0 3 | 0.1 8 | 死米 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | | |
| 10 | 被害粒 (茶米) | 0.1 21 | 0.1 5 | 0.1 4 | 0.0 5 | 0.1 15 | 0.1 6 | 死米 | 0.0 1 | 0.0 1 | - - | 0.0 0 | 0.0 1 | - - | 被害粒 (茶米) | 0.0 0 | 0.0 0 | - - | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | | | |
| | その他 | 2.6 861 | 2.3 170 | 2.9 222 | 3.2 343 | 2.9 734 | 1.6 127 | その他 | 4.2 1,792 | 6.2 471 | 6.2 525 | 3.7 513 | 5.0 1,508 | 2.3 287 | その他 | 2.1 592 | 3.3 133 | 4.0 165 | 1.4 137 | 2.4 435 | 1.5 157 | | | |
| | 計 | 100.0 33,495 | 100.0 7,431 | 100.0 7,551 | 100.0 10,769 | 100.0 25,752 | 100.0 7,743 | 計 | 100.0 42,336 | 100.0 7,575 | 100.0 8,427 | 100.0 13,973 | 100.0 29,975 | 100.0 12,360 | 計 | 100.0 28,301 | 100.0 3,997 | 100.0 4,168 | 100.0 9,603 | 100.0 17,768 | 100.0 10,533 | | | |

注) 四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。

資料：東北農政局山形農政事務所

22 「一等米になれなかった」品位格付理由（平成16年3月末現在）

