

57 麦類・大豆奨励品種等の特性表

(1) 大麦・小麦

種 類	早 中 晩	品 種 名	来 歴 (育成場所)	採 用 年 次	出 穂 期 月 日	成 熟 期 月 日	稈 長 cm	穂 長 cm	穂 数 本/m <sup>2</sup>	芒 の 長 短	株 の 開 閉	穂 発 芽 性	脱 粒 性	秋 ま き 性 程 度	玄 麦			質 の 硬 軟	品 質	抵 抗 性				
															10 a 当 量 た り kg	千 粒 量 (g)	リ ッ ル 重 (g)			耐 寒 雪 性	耐 倒 伏 性	耐 肥 性	凍 害 性	抵 抗 性
大 麦	中	べんけいむぎ	福系110号×バンダイハダカ (福島農試会津支場)	昭和 54年	5 月 4 日	6 月 12 日	84	3.7	477	長	中		中		402	31.4	719	中 の 上	強	極 強	強	強	中	
小 麦	早	ナンブコムギ	農林33号×農林27号 (盛岡農業改良実験所)	昭和 56年	5 月 16 日	6 月 25 日	101	9.8	468	短	中	難	難		464	41.8	809	中 の 中	強	中	強	強	中	
	晩	キタカミコムギ	東北101号×農林83号 (東北農試)	昭和 56年	5 月 20 日	7 月 3 日	101	9.3	358	長	中	易	易	}	479	43.8	786	上 の 下	中	やや 強	強	中	中	
	早	ネバリコシ	関東107号×チホクコムギ (東北農試)	平成 13年	5 月 20 日	6 月 27 日	89	8.4	474	極 短	中	難			503	36.2	813	やや 軟	上 の 下	やや 強	強	強	中	強

(2)大豆

早 中 晩	区 分	品 種 名	来 歴 (育成場所)	採 用 年 次	は 種 期 月 日	成 熟 期 月 日	出 穂 期 月 日	生 態 型	主 茎 長 (cm)	分 枝 数 (本)	主 茎 節 数	草 型	伸 育 型	毛 茸 の 色	花 色	熟 莢 色	裂 莢 性	子 実				粗 蛋 白 質 %	粗 脂 肪 %	品 質	耐 倒 伏 性	病 害 虫 抵 抗 性				
																		10 a 当 た り (kg)	百 粒 量 (g)	形 状	裂 皮					種 皮 色	臍 色	ウ ィ ル ス 病	紫 斑 病	ダ イ ズ シ ス ト
晩	中粒 白目	スズユタカ	刈系52号×オクシロメ (東北農試)	昭和 57年	6 月 3 日	8 月 3 日	10 月 19 日	c	64.3	5.2	15.8	円	有限	白	紫	暗褐	中	314	26.1	扁球	中	黄白	黄	37.1	21.7	上 の 中	中	極強	中	強
晩	中粒 白目	タチユタカ	房成×刈系92号 (東北農試)	昭和 62年	6 月 3 日	8 月 2 日	10 月 17 日	c	60.7	4.4	16.4	円	有限	白	紫	暗褐	難	281	27.6	扁球	難	黄白	黄	42.5	19.8	上 の 中	強	極強	中	中
中早	中粒 白目	トモユタカ	東北52号×刈系102号 (東北農試)	平成 3年	6 月 3 日	7 月 29 日	10 月 7 日	b	55.6	5.5	14.0	円	有限	白	紫	褐	中	269	26.8	楕円形	難	黄白	黄	44.7	21.9	中 の 中	強	中	中	強
中早	大粒 白目	リュウホウ	スズユタカ×刈交343F 6 (東北農試)		6 月 5 日	7 月 26 日	10 月 4 日	b	44.6	4.0	12.2	円	有限	白	紫		中	316	29.4	楕円形	難	黄白	黄				や や 強	AB 強 CD 弱	中	強