

東南村山からおいしさを極める！

# おいしい米づくり情報

第6号 中干し 編

発行：令和5年6月23日

山形おいしさ極める！米づくりプロジェクト村山地域本部  
村山総合支庁農業技術普及課  
(TEL:023-621-8295)

## 目標茎数を確保した圃場から 直ちに中干しを実施!

### 中干し開始の目安

- 目標茎数を確保したら、中干しを実施し、幼穂形成期(出穂 30 日前頃)までに終了します。
- 基本的な中干しは、**圃場に小ヒビが入る程度**が目安です。圃場の生育量に合わせて、中干しの強度(乾き具合)を調節します。

表 中干し開始の茎数目安(本/株)

植込株数	つや姫	雪若丸	はえぬき
70株/坪植え	19本程度	26本程度	21本程度
60株/坪植え	22本程度	29本程度	24本程度

### 6月19日現在の生育状況


(「はえぬき」「つや姫」「雪若丸」)

- ・草丈：短い～やや長い (圃場間差が大きい)
- ・茎数：少ない
- ・葉数：平年並み ・葉色：並～濃い

### 茎数が不足している場合

圃場をよく見て茎数をしっかり確認!!

- 茎数が不足している場合、6月中は引き続き**水深 2～3cm の浅水管理**として日中は**止水し、茎数確保に努めましょう。**
- 土壌のワキ(異常還元)による茎数不足や葉色低下が見られる場合は直ちに**夜間落水**や**田干し**を行い、6月中に有効茎数を確保しましょう。



- 順調に茎数を確保している圃場は **6月25日頃**から中干しを実施!

### 作溝について

#### 作溝の役割

- ・圃場停滞水を速やかに排水し、「中干し」の効果を高める。
- ・出穂期以降の、湛水・間断かんがい・落水の速やかな切替えが容易に。

- 土が「<sup>ようかん</sup>羊糞状」の硬さになったら、**深さ 15cm 程度の作溝を 3～5メートル間隔**で実施しましょう。

### 中干しの役割

- ① 無効分げつの抑制
- ② 根の健全化
- ③ 受光態勢の良化
- ④ 地耐力の向上

※基肥一発肥料を使用した場合、生育量を調整できる最後のチャンスです!



中干し後の作溝をした圃場

斑点米カメムシ類は、発生予察情報では発生量が“**やや多い**”予想です。  
畦畔と圃場周辺の除草と水田内の雑草対策(ヒエ、ホタルイ)を徹底しましょう!  
水田内で葉いもちの発生が確認されています。圃場を観察し、**早期に発見・発生初期に防除を!**