

稲作だより

第9号

令和5年7月10日発行
山形おいしさ極める！
米づくり日本一プロジェクト
西村山農業技術普及課
TEL：0237-86-8287

出穂は平年並み～やや早い予想！！
遅れない穂肥と適切な水管理を行いましょう！！

【管内の生育状況（7/10 普及課調べ）】

品種	年次	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉数 (枚)	葉色 (SPAD値)
はえぬき (寒河江市高屋)	本年	65.6	699	10.8	40.4
	平年	62.5	728	10.7	40.7
	平年比	105 (やや長い)	96 (やや少ない)	+0.1 (並み)	-0.3 (並み)
つや姫 (寒河江市高屋)	本年	62.1	648	10.5	39.9
	平年	61.2	594	10.7	38.7
	平年比	101 (並み)	109 (多い)	-0.2 (並み)	+1.2 (やや濃い)
雪若丸 (寒河江市寒河江)	本年	48.9	647	10.6	39.5
	平年値	52.2	653	10.7	41.8
	平年比	94 (短い)	99 (並み)	-0.1 (並み)	-2.3 (薄い)

・移植日は「はえぬき」「つや姫」5/17、「雪若丸」5/23

【穂肥】

- ☑ 中干し後、基準量の範囲内で行いましょう。
- ☑ 生育量が過剰な場合は、窒素成分量を0.5～1kg/10a減らしましょう。
- ☑ 玄米タンパク質含有率が高まることを防ぐために、遅れずに追肥を行いましょう。

品種毎の穂肥時期・量の目安 (N成分 kg/10a)

地域・品種	移植日	出穂期 (予想) ※	出穂 30日前	出穂 25日前	出穂 20日前	出穂 15日前
ひとめぼれ	5月20日	8月2日	-	-	7月13日 1.0～1.5kg	-
はえぬき	5月17日	8月2日	-	7月8日～ 1.0～1.5kg	-	-
平坦 雪若丸	5月23日	8月5日	-	7月11日 1.0～1.5kg	-	-
コシヒカリ	5月20日	8月5日	-	-	-	7月21日 1.0～1.5kg
つや姫	5月17日	8月6日	7月7日 1.0～1.5kg	-	-	-

※ひとめぼれ、コシヒカリは農業総合研究センター予想、それ以外の品種は普及課予想

LINE を活用した情報提供を行っています。
QRコードを読み取り登録の上、ぜひご活用ください！




【中干し後の水管理】

- ☑ 中干し終了後は、走り水で**飽水管理**(足跡に水がにじみ出る程度)した後、**徐々に間断かん水(2日湛水、2日落水)**に切り替え、根の活力維持に努めましょう。
- ☑ 今年も水不足になることが懸念されるため、節水管理を心掛け、かけ流しによる水管理は絶対に行わないようにしましょう。

【斑点米カメムシ類対策】……今年もカメムシの発生量が多い！

- ☑ **7月中旬**まで継続した草刈りを徹底しましょう。
- ☑ 8月中の草刈は行わず、今後は防除を徹底して行い、カメムシの被害を抑えましょう。
- ☑ **地域ぐるみの一斉防除**で、カメムシの被害防止を図りましょう！！

図1 斑点米カメムシ類の防除対策



【いもち病対策】…管内の水田内でいもち病が確認されています！

- ☑ 圃場を定期的に見回り、いもち病の早期発見と適切な防除に努めましょう！
- ☑ 育苗箱施用薬剤の持続効果は7月上旬頃までです。
→ **7月中旬以降は早めに予防剤を散布しましょう!!**
- ☑ いもち病の発生が確認されたら、**治療効果のある薬剤**で発生初期に防除しましょう!!

止葉に発生した葉いもち病斑



農作業事故、熱中症に要注意!! 農薬適正使用を徹底!!