



令和3年 第2号

令和3年8月31日

西おきたま つや姫だより

山形おいしさ極める！米づくりプロジェクト置賜地域本部

登熟進度の差が大きい！圃場ごと適期判断！

- 今年、8月上旬までは高温・多照、8月中旬以降は低温傾向で経過しているため、出穂時期の早晩で登熟の進み具合の差が大きくなっています。
- 積算気温による刈取時期の目安の基本に、適期の晩限（1,200℃ 8/8出穂では到達日：10/7）まで刈り終えるよう、計画的に刈取りを進めましょう！

つや姫の刈取り時期の目安

品種名	出穂期	積算気温（℃）	刈取り時期の目安	刈始めの青糲歩合（%）
つや姫	8月8日頃	1,000～ 1,200	9月23日～10月7日	15%以下

※8月23日まで実測値、以降は平年値の平均気温を使用（アメダス高畠）。

- 刈取り時期は出穂後の積算平均気温を目安とし、ほ場ごとに、①**青糲歩合（15%以下）** ②**糲水分（25%以下）** ③**枝梗の黄化（3分の2以上）**等を確認し、刈取開始時期を判断しましょう。

つや姫の穂揃期の生育状況

- 管内のつや姫の出穂は、8月8日頃と平年より2日程度早い出穂期となりました。
- ㎡あたり糲数は、やや多い状況です。

つや姫	出穂期	穂数 (本/㎡)	1穂糲数 (粒)	㎡あたり糲数 (百粒/㎡)	葉色 (SPAD)
川西町	8/8	482	68.0	328	31.8
飯豊町	8/6	552	70.0	386	30.3
指 標	8/14	410	75.0	310	33.0

乾燥・調製は慎重に！

- 収穫後は速やかに乾燥機に張り込むことが基本です。すぐに乾燥できない場合には通風・循環を行い、ヤケ米の発生を防ぎます。
- 高水分糲（水分25%以上）**を急激に乾燥すると胴割れしやすくなるので注意が必要です。青糲が多い（糲水分のバラつきが多い）場合は、「水分の戻り」に注意し、「夜間休止乾燥」や「二段乾燥」を行いましょう。
- 糲すり前に糲温や糲水分を確認し、必ず試しずりをして、胴割れや肌ずれの発生を防ぎます。
- 良質米生産のために、1.90mm網目（LL）以上で選別します。**
- ※「食味向上チェックリスト」を記帳し、11月末まで必ず提出してください。

STOP！農作業事故！～あせらず！気もまず！農作業！～