

稲作だより

第 6 号

令和 7 年 6 月 12 日発行
やまがた温暖化対応
米づくり日本一運動
西村山農業技術普及課
TEL : 0237-86-8301

⚠ 茎数少ない！浅水管理とワキ解消で分けつを促進！ ⚠

管内の生育状況（6 月 10 日時点）

普及課の生育調査圃（寒河江市高屋）では、生育量は少なく推移しています。

品種	年 次	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉数 (枚)	葉色 (SPAD値)	移植日 (月/日)
はえぬき	本 年	26.2	200	6.3	34	5/18
	平 年	28.5	284	6.6	37	5/17
	平年比	短い	少ない	やや少ない	淡い	—
つや姫	本 年	25.6	267	6.6	33	5/16
	平 年	27.0	261	6.5	37	5/16
	平年比	短い	平年並み	平年並み	淡い	—
雪若丸	本 年	18.3	168	5.6	28	5/22
	平年値	24.6	224	6.3	35	5/22
	平年比	短い	少ない	少ない	淡い	—

・移植日は「はえぬき」5/18、「つや姫」5/16、「雪若丸」5/22

本田管理のポイント

1 茎数確保に向けた水管理

- 指標と比較して茎数が少ない圃場は、
水深 2～3cm の浅水管理を徹底しましょう。

- 日中は止水**し、できるだけ水温を高め、
入水は夜間か早朝に行いましょう。

分けつを促すには、水温の日較差（昼夜の水温の差）を大きくします。

- 深水で生育が停滞**している圃場が多く見られます。
ただちに水位を下げて、分けつの発生を
促しましょう。また、定期的に圃場を見回り、
適切に入水を行いましょう。




図 水田の水深と水温の関係

調査日：令和 6 年 5 月 25 日

調査地：鶴岡市内水田

観測地の気象データ：

日照時間 8hr、最高気温 16.9℃、最低気温 9.4℃

LINE を活用した情報提供を行っています。
QR コードを読み取り登録の上、ぜひご活用ください！



2 土壌の異常還元（ワキ）対策

- 管内では、土壌の異常還元（ワキ）等の影響から、生育量が少なく推移しています。
ワキは**晴天・高温が続くと発生**します。**今後もさらに高温が続く予報**ですので、**早急に水管理による対策**を行いましょう！
- ワキの程度が強い場合は、**夜間落水**や**1～2 日程度の田干し**を行い、根域環境の改善を図りましょう。



ワキの発生した圃場に足を踏み入れた様子



イネの根の様子
(ポット栽培、移植 20 日後)

表 「ワキ」の発生程度による生育への影響と対策

「ワキ」の程度	生育への影響	対策
水田を歩くと気泡が発生する	中：根の活力低下	水交換
水田を歩くと盛んに気泡が生じ、においを感じる	大：根張り不良	水交換、夜間落水
水田を歩くと著しく気泡が生じ、においを強く感じる	特大：根の伸長阻害 地上部黄化	田干し（曇天日 2 ～ 3 日）

3 いもち病対策

- 取置き苗から本田へのいもち病の伝染を防ぐため、**取置き苗は今すぐ処分**しましょう。
- 育苗箱施用薬剤を使用した水田でも、圃場の観察を行い、いもち病の早期発見に努めましょう。



4 斑点米カメムシ類対策

- 病虫害防除所の予測によると、斑点米カメムシ類の発生は多い見込みです。
- 水田内の除草、**畦畔の草刈り**や休耕田の耕耘等の雑草対策を徹底し、**斑点米カメムシ類の発生源を減らしましょう!!**
- 雑草が発生している圃場は、農薬の登録内容をよく確認して、中・後期除草剤を散布しましょう。
- 特別栽培の場合は、使用できる農薬が限定されるため、普及課や JA に確認しましょう。

STOP 農作業事故!!
熱中症に要注意!!
農薬適正使用を徹底!!

転落・転倒事故を防止しましょう
あせらず、ゆとりを持って作業を進めましょう
ラベルをよく見て登録内容を確認しましょう