

稲作だより

～第6号 茎数確保 編～

茎数少ない！浅水管理で茎数確保に努めましょう

6月10日現在における普及課の調査圃は、平年よりも茎数が少ない圃場が目立ちます。特に、移植が遅れた圃場や深水管理が続いた圃場で茎数が少ない傾向にあります。現在は穂になる茎が増える時期です。浅水管理とワキ対策で茎数を確保しましょう！

1 生育概況

品種 (地域)	年次	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉数 (枚)	葉色 (SPAD値)
はえぬき (尾花沢市尾花沢)	本年	26.3	124	5.2	28.4
	平年	23.2	160	5.6	28.1
	平年比・差	113%	78%	-0.4	+0.3
つや姫 (村山市河島)	本年	24.6	124	5.6	30.5
	平年	26.3	176	5.4	31.9
	平年比・差	94%	70%	+0.2	-1.4
雪若丸 (東根市野田)	本年	27.8	203	6.3	39.2
	平年	24.4	197	6.2	37.1
	平年比・差	114%	103%	+0.1	+2.1

2 当面の技術対策

6月20日頃までの10日間は、穂数を確保するための重要な時期です。今すぐ生育状態を確認し、適正茎数を確保しましょう。

6月20日時点の生育指標

品種	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉数 (枚)	葉色 (SPAD値)
はえぬき	34	470	8.2	40
つや姫	38	420	8.2	39
雪若丸	32	460	8.1	43

(1) 水管理

- 気温が高くなり土壌の異常還元（ワキ）が強まっています。下表を参考に圃場の条件に合わせた対策を行いましょう。

ワキの程度と対策

ワキの程度	足を踏み込んだ時の状態	生育への影響	対策
弱	少し気泡の発生がある	なし	—
中	気泡の発生が多い	根の活力低下	速やかな水交換
強	盛んに気泡が発生する。 悪臭がする。	根張り不良	田干し 夜間落水

- 日中止水、夜間かんがいを徹底し、水深2～3cmの浅水管理で分げつを促します。

(2) 「スマートつや姫」で中干し適期を確認!!

スマートつや姫 QR コード

- ・「適期作業カレンダー」で中干しの開始時期が予測できます。自身の圃場を確認して、中干し適期までの茎数確保に努めましょう。
- ・品種は「つや姫」「雪若丸」「はえぬき」「コシヒカリ」「ひとめぼれ」「あきたこまち」の6品種に対応




モバイル版



PC版

ID、パスワードは普及課までお問い合わせください。



(3) 斑点米カメムシ類の発生量「多い」!! 草刈りを徹底しよう!

- ・6月2~4日の県病虫害防除所の調査によると、斑点米カメムシ類の発生量は「多い」状況です。生息密度を下げるため、畦畔・農道等の除草を徹底しましょう。
- ・水田内の残草は斑点米カメムシ類の生息場所となるだけでなく、斑点米カメムシ類が早期に水田内に進入する要因になります。必要に応じ、後期除草剤を使用して残草が残らないよう管理しましょう。



(4) 葉いもちの発生に注意!!

- ・最低気温が20℃を超える日が続くと、葉いもち拡大の恐れがあります。
- ・取置き苗は直ちに処分しましょう。
- ・例年発生が心配される地域では、箱施用剤を施用していてもこまめに圃場の見回りを行い、病斑を見つけたらすぐに防除を行いましょう。
- ・水面施用剤(粒剤・ジャンボ剤・豆つぶ剤)を施用する場合は、6月20日頃まで散布しましょう。

◎農作業安全を徹底しましょう! 熱中症対策も忘れずに!!
水分、ミネラルを十分に補給。こまめに休憩をとしましょう