

**生育量は十分に確保されています。
速やかに作溝・中干しを始めましょう！**

中干し時期到来！

1 6月20日現在の生育診断圃の生育状況

ほぼ一致！

スマートつや姫

品種	年次	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉数 (枚)	葉色 (SPAD)	6/20の葉数 (枚)	中干し 開始時期 (8葉期)
はえぬき 酒田市荻島 5/13移植	本年	37.1	567	8.0	38.8	8.1	6/20頃
	前年	36.6	319	8.1	39.3		
	平年	39.4	559	8.5	41.1		
	平年比	94	101	-0.5	-2.3		
つや姫 酒田市漆曽根 5/13移植	本年	39.7	426	8.0	40.0	8.3	6/19頃
	前年	42.2	472	8.5	41.0		
	平年	40.5	435	8.1	40.6		
	平年比	98	98	-0.1	-0.6		
雪若丸 酒田市前川 5/12移植	本年	36.5	598	8.3	47.0	8.5	6/18頃
	前年	37.7	545	9.4	42.2		
	平年	33.6	549	8.7	44.9		
	平年比	109	109	-0.4	+2.1		

平年：令和2年～令和6年の5カ年

生育診断圃の生育は、6月5日頃から高温で経過したことから、葉数は平年並程度まで回復しています。3品種いずれも中干し開始目安となる茎数（有効茎数の8～9割）が確保されており、葉数も8葉に達しているため、速やかに作溝・中干しを始めましょう！

中干し開始の目安となる茎数（有効茎数の80～90%）

品種	はえぬき	つや姫	雪若丸	ひとめぼれ
m ² 当たり（本/m ² ）	430～490	350～400	460～520	400～450
株当たり	70株/坪（21.2株/m ² ）	20～23	17～19	22～25
	60株/坪（18.2株/m ² ）	24～27	19～22	25～29

2 今すぐ作溝・中干しを開始しましょう！

中干し開始が遅れると、無効分げつの発生、穂肥時の葉色が濃い、籾数過剰・登熟不良による収量や品質の低下、秋に田んぼが軟らかい（乾かない）・・・などデメリットばかりです。

○生育量が確保された圃場から、速やかに作溝・中干しを始めましょう！！

○一方、移植が遅い圃場等では、葉齢展開が遅れているところもあります。青田巡回指導での診断や「スマートつや姫」適期作業カレンダー等を参考に、遅れずに作溝・中干しを開始しましょう。

適期作業カレンダーで
生育状況をチェック！

「スマートつや姫」
アクセスはこちら→



中干しの様子
(6月20日、酒田市内圃場)




図1 根相への中干し効果

農業試験場置賜分場 品種：ササニシキ

中干しにより白根が増加

地力ごとの中干しの目安

地 力： 低～並	7～10日間を目安に
生育量： 並～良	小ひびが入る程度
地 力： 高	11～15日間を目安に
生育量： 過多	やや強めに実施
葉 色： 極端に濃い	(強すぎて上根が切れてしまわないように)




図2 茎数の推移

普及課実証圃事例 品種：雪若丸

中干しで生育調整ができないと・・・

↓
籾数過剰

↓
×高温による品質低下
×登熟不良によるくず米増 (R4)

3 初期生育が不足している場合の技術対応 <雪若丸>

○浅水管理や田ワキ対策を実施した上で、6/20時点で m^2 当たり茎数300本以下(坪70株:14本、坪60株:16本以下)かつ葉色(SPAD値)40以下の場合、生育不足です。状況に応じて10a当たり窒素成分1kgを補完追肥します。なお、補完追肥を実施した場合は、相当量を穂肥から減肥します。

4 補植苗でいもち病確認！取置き苗は今すぐ処分しましょう！

○酒田と鶴岡において、補植苗で平年より早いいもち病が確認されました。
○まだ補植苗が残っている圃場では、**早急に処分**するとともに、圃場内を観察して本田内での発生にも注意しましょう。

スマートつや姫

NEW お気に入り圃場登録機能が追加！

- ・圃場にピンを立て、地点名を登録
- ・色分けできるので、品種ごとに区別が可能
(例：青:つや姫 黄:雪若丸)

不明な点は、JA 又は酒田農業技術普及課まで

<圃場登録の方法>



米づくり情報 次号7月1日頃 発行予定

(6/30 生育調査結果、穂肥対応 等)

酒田普及課 LINE

からも受け取れます
友だち登録こちら→

