

西おきたま 米づくり情報 No. 9

令和 8 年 7 月 13 日
やまがた温暖化対応米づくり日本一運動置賜地域本部
西置賜農業技術普及課

出穂の時期は平年並の予想。茎数が多く、籾数過剰が心配される圃場では、登熟歩合を高めるための管理を実践！

7月10日現在の生育は、草丈が短く、茎数が多く、葉色が淡い傾向です。

幼穂発育調査等から出穂は平年並と見込まれ、「はえぬき」「雪若丸」の出穂は8月3日頃、「つや姫」の出穂は8月8日頃と予想されます。

また、7月2日に斑点米カメムシ類注意報が発出されました。畦畔や農道の草刈りを徹底して、生息密度を下げ、適期防除で被害ゼロを目指しましょう。

生育状況（7月10日現在、西置賜農業技術普及課生育診断圃）

平坦部「はえぬき」の生育

項目	飯豊町		概況 (平年値との比較)
	調査値	平年比・差	
草丈(cm)	60.1	99	並
茎数(本/㎡)	695	113	多い
葉数(枚)	11.5	+0.4	やや多
葉色(SPAD)	44.2	-0.1	並

「雪若丸」の生育

項目	飯豊町		概況 (指標値との比較)
	調査値	指標比・差	
草丈(cm)	53.3	86	短い
茎数(本/㎡)	778	106	多い
葉数(枚)	12.0	+0.4	やや多
葉色(SPAD)	44.4	-0.8	やや淡

「つや姫」の生育

項目	飯豊町		概況 (平年値との比較)
	調査値	平年比・差	
草丈(cm)	60.1	91	短い
茎数(本/㎡)	581	101	並
葉数(枚)	10.8	±0	並
葉色(SPAD)	38.0	-2.6	淡い

1か月予報（7月9日 仙台区気象台発表）

気温：7/11～7/17：高い
7/18～7/24：高い
7/25～8/7：並み～高い
降水量：平年並みの見込み
日照時間：平年並みの見込み

茎数が多く、籾数過剰による品質低下(充実度不足)や収量低下(千粒重低下による屑米増加)のリスクが高まっています。生育に応じた穂肥量の診断や登熟を高める水管理を徹底しましょう。

ケイ酸施用は良いことづくめ！

ケイ酸は、光合成促進や根の伸長促進、窒素吸収量を増加させる等の効果があるため、高温の影響を軽減することが期待できます。一方で、高温時はケイ酸の吸収が低下しやすく、高温ストレスの増大は玄米の品質が低下する要因となります。


水口施用の資材等を積極的に活用して、暑さに負けない稲を作りましょう。

「 積極的なケイ酸施用でこれから的高温に備えましょう！ 」


中干し終了後～出穂までは「飽水管理」「間断かん水」を徹底し、根の活力維持！

- 中干し終了直後は、飽水管理（土壌表面の足跡に水が残る程度）とし、徐々に間断かん水（2日湛水・2日落水）に切り替え、根の活力を維持します。
- 中干しが十分ではないほ場では、間断かん水の落水期間をやや長めにしましょう。

水管理のイメージ



【飽水管理のイメージ】



◎ 水のためっぱなしは致命傷！土壌の還元が進み根へのダメージ！

◎ 水管理を効率的かつ容易にするため、作溝は必ず実施しましょう！

いもち病に注意！

- 「葉いもち」の発生に要注意！感染好適日が続いています。
早期発見・早期防除を徹底しましょう。
- 「穂いもち」対策の粒剤は出穂20～10日前に施用しましょう。



葉いもちの病斑

斑点米カメムシ類 注意報発令！ 発生量「多い」！

- 地域全体で斑点米カメムシ類の密度を減らすことが重要です。
- 7月20日頃まで畦畔・農道、雑草地の除草（草刈）を地域ぐるみでしっかり行いましょう。
- 水田内のイヌホタルイやノビエは、アカスジカスミカメの発生源になります。残草対策を徹底しましょう。
※除草剤の使用基準を確認し、使用しましょう。



アカヒゲホソミドリカスミカメ



アカスジカスミカメ

農作業事故・熱中症に注意！

山形県農薬危害防止運動実施中！～農薬を使用する際は使用基準を再確認！その都度記帳！～